

令和4年10月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「サフオイル乳剤」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺ダニ剤「サフオイル乳剤」が令和4年10月26日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : サフオイル乳剤 (第22801号)
有効成分・% : 調合油(サフラワー油及び綿実油の含量として) 97.0%
登録年月日 : 令和4年10月26日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更 :

- ・ 作物名「野菜類 (いちご、トマト、ミニトマトを除く)」、「いちご」、「トマト」、「ミニトマト」に適用病害虫名「アブラムシ類」を追加する。
- ・ 作物名「とうもろこし」、適用病害虫名「ハダニ類」を追加する。

<2>注意事項等の変更

なし

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	調合油を含む農薬の総使用回数		
かんきつ	ミカンハダニ	500倍	200～700 L/10a	収穫前日まで	—	散布	—		
	サビダニ類	300倍							
野菜類 (いちご、トマト、ミニトマトを除く)	ハダニ類 アブラムシ類	300～500倍	100～500 L/10a						
	チャノホコリダニ コナジラミ類 うどんこ病	300倍							
いちご	アブラムシ類	300～500倍	—					定植前	2～10秒間 苗浸漬
	ハダニ類	300倍							
	チャノホコリダニ コナジラミ類 うどんこ病	300倍							
トマト ミニトマト	ハダニ類 アブラムシ類	300～500倍	100～500 L/10a					収穫前日まで	散布
	チャノホコリダニ トマトサビダニ コナジラミ類 うどんこ病	300倍							
とうもろこし	ハダニ類	300～500倍	—	発生初期	10秒～1分間 挿し穂浸漬				
花き類・観葉植物 (きくを除く)	ハダニ類								
きく	ハダニ類					300倍			