

令和5年3月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「OATイオウフロアブル」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫殺菌剤「OATイオウフロアブル」が令和5年3月22日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : OATイオウフロアブル (第23642号)
有効成分・% : 硫黄 52.0%

登録年月日 : 令和5年3月22日 (適用拡大)

〈1〉適用内容の変更：

- ・ 適用病虫害名の追加：りんご／褐斑病（500倍）
- ・ 使用時期の変更：
 - かんきつ／ミカンサビダニ、チャノホコリダニ：「―」→「発生初期」
 - トマト／トマトサビダニ、ミニトマト／トマトサビダニ：「―」→「発生初期」
 - いちご／うどんこ病（500～1000倍）及び芝／さび病（300倍）を除く病害：「―」→「発病前～発病初期」
- ・ 使用液量の欄を追加し、使用液量を以下のとおりとする。
 - りんご、かんきつ、もも、ネクタリン、あんず、うめ、かき：200～700L/10a
 - 麦類：60～150L/10a
 - 野菜類（すいか、かぼちゃ、トマト、ミニトマト、ねぎ、わけぎ、あさつき、いちごを除く）、すいか、かぼちゃ、トマト、ミニトマト、ねぎ、わけぎ、あさつき、いちご、ぺぽかぼちゃ（種子）：100～300L/10a
 - 芝：1L/m²
- ・ 使用方法の変更：芝/「1 m²当り 1L 散布」⇒「散布」

〈2〉注意事項等の変更

なし

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	硫黄を含 む農薬の 総使用回 数	
りんご	うどんこ病 褐斑病	500 倍	200～ 700L/10a	発病前～ 発病初期	—	散布	—	
かんきつ	ミカンサビダニ チャノホコリダニ	400 倍		発生初期				
もも ネクタリン あんず うめ	黒星病	500 倍		発病前～ 発病初期				
かき			うどんこ病					
麦類	400 倍	60～ 150L/10a						
	赤かび病							400～800 倍
	赤さび病		400 倍					
野菜類 (すいか、かぼちゃ、 トマト、ミニトマト、 ねぎ、わけぎ、あさつ き、いちごを除く)	うどんこ病	500～1000 倍	100～ 300L/10a					発病前～ 発病初期
すいか かぼちゃ		500 倍						
トマト ミニトマト		500～1000 倍						
		トマトサビダニ		400 倍				
ねぎ わけぎ あさつき	うどんこ病	500～1000 倍		発病前～ 発病初期				
	さび病	500 倍						
いちご	うどんこ病	500～1000 倍		親株床初 期				
		2000 倍	発病前～ 発病初期					
		ぺぽかぼちゃ (種子)		500 倍				
芝	さび病	300 倍	1L/㎡	発病初期				