


オンコル[®]CR

箱粒剤

3kg入


は種時から移植時まで使える

適用害虫と使用方法

2022年11月時点の登録内容

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンフラカルブを含む農薬の総使用回数
稲(育苗箱)	イネミズゾウムシ イネドロオウムシ ヒメトビウンカ セジロウンカ ツマグロヨコバイ イネヒメハモグリバエ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り50g	は種時(覆土前) ～移植当日	1回	育苗箱の 上から均一に 散布する。	1回
		高密度には種する 場合は1kg/10a (育苗箱 30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り50～100g	移植当日			
	ニカメイチュウ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り50g				



イネミズゾウムシ



ヒメトビウンカ



セジロウンカ



ツマグロヨコバイ



イネドロオウムシ

①「オンコル」はOATアグリオ(株)の登録商標


OATアグリオ株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1

は種時から
移植時まで使える

オンコル[®]CR 箱粒剤


[有効成分]ベンフラカルブ 6.0% [毒性]普通物*
[有効年限]5年 [包装]3kg×6袋(ケース)

*毒劇物に該当しないものを指している通称

特長

- CR(コントロール・リリース)技術により、は種時から移植当日まで幅広い時期に使用できます。
- は種時、移植当日処理ともに安定した効果を示します。
- 幅広いスペクトラムをもち、広範囲の害虫に有効です。

イネミズゾウムシに対する効果



(社)宮城県植物防疫協会(2019年)

品 種: ひとめぼれ

処理月日: 2019年4月12日

移植月日: 2019年5月12日

発生状況: 少発生

調査方法: 移植35日後に100株/区について食害度を、
移植55日後に8株/区について寄生幼虫・土壌数を調査

上手な使い方

- 本剤をは種時処理した場合、褐点症状、葉先枯れを生じるおそれがありますが、その後の生育・収量に影響はありません。



褐点症状



葉先枯れ症状

- 本剤をは種時処理した場合、高温条件では薬害を生じるおそれがありますので注意してください。
- 特殊な育苗方法(プール育苗等)では、薬害を生じるおそれがありますので使用はさけてください。

⚠ 使用上の注意事項

- 本剤を使用した場合には、カルボスルファンを含む剤は使用しないでください。
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけて移植してください。
- 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当りに乾粒として200から300g程度を高密度に播く場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を50から100gまでの範囲で調整してください。
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 稲苗の葉が濡れている場合薬害が生じやすいので、葉に付着している露を払い落としてから薬剤を散布し、軽く散水してください。
- 誤って過剰に使用すると褐点や葉先枯れ等の薬害を生じることもあるので、所定の使用量、使用方法を厳守してください。
- 本田が砂質土壌の水田や漏水田、未熟堆肥多用田の場合は使用をさけてください。
- 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはいないに行い、移植後田面が露出したりしないように注意してください。移植後は直ちに湛水し、極端な浅水、深水はさけてください。また、深植にならないように注意してください。
- 本田への移植後低温が続く、苗の活着遅延が予測される場合は使用をさけてください。または、は種時(覆土前)処理後あるいは移植後極端な高温が続くと予想される場合も使用をさけてください。
- セジロウカに対しては残効性に注意してください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 誤食などのないよう注意してください。
- 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
- 使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- ベンフラカルブによる中毒に対しては硫酸アトロピン製剤の投与が有効であると報告されています。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣を着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

[貯蔵上の注意事項] 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥し子供の手の届かない場所に密封して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

OAT アグリオ株式会社
OAT[®] <https://www.oat-agrio.co.jp/>
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1

コールセンター: ☎ 0120-210-928 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日をのぞく)