

令和6年2月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「ハチハチ乳剤」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチ乳剤」が令和6年2月14日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 ： ハチハチ乳剤（第20818号）

有効成分・％ ： トルフェンピラド……………15.0%

登録年月日 ： 令和6年2月14日（適用拡大）

＜1＞適用内容の変更：

- ・ 適用害虫名の追加：たまねぎ／ネギハモグリバエ（1000倍）

＜2＞注意事項等の変更

なし

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	トルフェンピラト [®] を含む 農薬の 総使用回数			
キャベツ	アザミウマ類	1000 倍	100 ～ 300 L/10a	収穫 14 日前ま で	2 回以内	散布	2 回以内			
	ハイマダラノメイガ、コナ ガ、アオムシ、アブラ ムシ類	1000～2000 倍								
はくさい	ナメクジ類	1000 倍						収穫 30 日前ま で	1 回	1 回
	アブラムシ類、ナモグ リバエ	1000～2000 倍								
レタス	ナメクジ類、べと病	1000 倍		収穫 7 日前ま で						
	アオムシ、コナガ アブラムシ類、キスジ ノミハムシ、ハイマダラ ノメイガ、ナモグリバエ、 カブラハバチ、ダイコ ンハムシ、白さび病、 ワッカ症	2000 倍								
だいこん	キスジノミハムシ、コ ナガ、ハイマダラノメイガ、 ナモグリバエ、アブラ ムシ類			収穫前日まで	2 回以内		2 回以内			
かぶ	ウリノメイガ、アブラ ムシ類、アザミウマ類、 コナジラミ類	1000～2000 倍								
きゅうり	うどんこ病、べと病、 褐斑病							収穫 7 日前ま で		
	にがうり らっきょう	アザミウマ類								
たまねぎ	アザミウマ類、べと病、 ネギハモグリバエ							収穫 7 日前ま で		
すいか	アブラムシ類、アザミ ウマ類	1000～2000 倍								
	コナジラミ類、うどん こ病	1000 倍						収穫 7 日前ま で		
ばれいしょ	アブラムシ類、ナスト ビハムシ	2000 倍								
やまのいも	アブラムシ類、ナガイ モコガ、葉渋病			収穫 7 日前ま で						
ねぎ	アザミウマ類、アブラ ムシ類、ネギハモグリ バエ、クロバネキノコ バエ類、ネギコガ、シ ロイチモジヨトウ、さ び病、べと病	1000 倍								
ブロッコリー	アオムシ、アブラムシ 類、コナガ	1000～2000 倍		収穫前日まで	1 回		1 回			
ピーマン	アザミウマ類									
にんにく	ネギコガ、チューリップサ ビダニ、アザミウマ類、 アブラムシ類、さび病	1000 倍		収穫 7 日前 まで	2 回以内		2 回以内			
	にら	ネギアザミウマ						収穫 14 日前 まで	1 回	1 回

作物名	適用病虫害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラト [®] を含む農薬の総使用回数
茶	チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ、チャノホコリダニ、チャノナガサビダニ	1000～1500 倍	200 ～ 400 L/10a	摘採 14 日前まで	1 回	散布	1 回
	チャトゲコナジラミ、マダラカサハラハムシ、ツマグロアオカスミカメ	1000 倍					
きく	アブラムシ類、アザミウマ類、ハモグリバエ類		100 ～ 300 L/10a	発生初期	4 回以内		4 回以内
	白さび病			発病初期			
しきみ	アザミウマ類		100 ～ 700 L/10a	発生初期			