

令和6年2月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「ハチハチフロアブル」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチフロアブル」が令和6年2月28日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ハチハチフロアブル（第21056号）
有効成分・% : トルフェンピラド……………15.0%

登録年月日 : 令和6年2月28日（適用拡大）

＜1＞適用内容の変更：

- ・ 適用害虫名の変更：かんきつ/ミカンサビダニ⇒サビダニ類

＜2＞注意事項等の変更

なし

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数	
なし	アブラムシ類、ニセナシサビダニ、アザミウマ類、クワコナカイガラムシ、チュウゴクナシキジラミ	2000倍	200～700 L/10a	収穫 30 日前まで	1 回	散布	1 回	
なし(苗木)	アブラムシ類、ニセナシサビダニ、アザミウマ類、チュウゴクナシキジラミ		100～700 L/10a	育苗期	2回以内			
かんきつ	サビダニ類	2000～3000倍	200～700 L/10a	収穫前日まで				
	アブラムシ類、チャノホコリダニ、カネタタキ	2000倍						
	アザミウマ類	1000～2000倍						
	ゴマダラカミキリ、コナカイガラムシ類、コナジラミ類、ミカンキジラミ、ヨモギエダシャク、ヨコバイ類、ミカンバエ成虫、ナメクジ類	1000倍						
すもも	アブラムシ類	2000倍		収穫14日前まで				
もも ネクタリン	シンクイムシ類	1000～2000倍		1000倍				収穫前日まで
	アブラムシ類、モモハモグリガ、モモサビダニ	2000倍						成虫発生期但し、 収穫前日まで
	アザミウマ類							
	クビアカツヤカミキリ							
さやえんどう 実えんどう	ナモグリバエ	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで				
	うどんこ病	1000倍						
キャベツ	コナガ、アオムシ、アブラムシ類、ハイマダラノメイガ、アザミウマ類			収穫14日前まで				
はくさい	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、キスジノミハムシ、ダイコンハムシ、ナメクジ類							
	アブラムシ類							1000～2000倍
レタス	アブラムシ類、ナモグリバエ							1000倍
	ヒメフタテンヨコバイ、ナメクジ類							

作物名	適用病虫害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数
非結球レタス	アブラムシ類、ナモグリバエ	2000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで	1回	散布	1回
セルリー				収穫30日前まで	2回以内		2回以内
カリフラワー	コナガ	収穫3日前まで					
いちご	アブラムシ類、アザミウマ類、カキノヒメヨコバイ、チャノホコリダニ、クロバネキノコバエ類、うどんこ病	1000倍	1番花の開花まで	1回	1回		
すいか	アブラムシ類	1000～2000倍	100～800 L/10a	収穫前日まで	2回以内		2回以内
	アザミウマ類、うどんこ病	1000倍					
アスパラガス	ネギアザミウマ、アブラムシ類、コナジラミ類、ジュウシホシクビナガハムシ、ツマグロアオカスミカメ						
しょくようほおずき	コナジラミ類	2000倍	100～300 L/10a				
茶	チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホコリダニ、チャノナガサビダニ	1000～1500倍	200～400 L/10a	摘採14日前まで	1回		1回
	マダラカサハラハムシ、チャトゲコナジラミ	1000倍					
花き類・観葉植物	アザミウマ類		100～300 L/10a	発生初期	4回以内		4回以内
チューリップ	アブラムシ類	1000～2000倍	300L/10a		3回以内		
	チューリップサビダニ	500倍	—	掘取後～植付前	1回	15分間球根浸漬	