

殺菌剤

登録番号 第23575号

ジオゼット水和剤

(ポリオキシシン水和剤)



- 有効成分 ポリオキシシンD亜鉛塩 2.25%
(ポリオキシシンDとして20,000PsDu/g)
- 性 状 淡褐色水和性粉末 63μm以下
- 毒 性 普 通 物
- 有効年限 6 年
- 包 装 500g×20袋／ケース 1kg×20袋／ケース

【特 長】

1. 野菜のリゾクトニア（*Rhizoctonia=Thanatephorus*）による病害（適用内では、キャベツ/株腐病、レタス/すそ枯病、きく/立枯病）に優れた効果を示します。
2. 独自の作用性（キチン生合成阻害）を有し、既存薬剤の耐性菌にも有効です。
3. 天敵、訪花昆虫に対する影響が小さく、IPM（総合的病害虫管理）や環境保全型農業に適しています。
4. 慣行のローテーションに加えることにより、安定した効果が期待できます。
5. 微生物由来の天然物質成分であり、化学合成農薬ではありません。

【適用病害と使用方法】

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (10a当り)	使用時期	本 剤 の 使用回数	使用方法	ポリオキシシンD を含む農薬の 総使用回数
きゅうり	うどんこ病 灰色かび病	1000	100～300ℓ	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
キャベツ	株腐病			収穫14日前 まで	3回以内		3回以内
ブロッコリー	黒すす病	500		収穫前日まで			
レタス	すそ枯病	1000		収穫14日前 まで			
非結球レタス	灰色かび病	500					
ねぎ	黒腐病 さび病 葉枯病	1000					
	白絹病	500					
にら	白絹病	500～1000		収穫前日まで			
アスパラガス	茎枯病 斑点病	500	100～400ℓ				
きく	立枯病		100～300ℓ	発病初期	8回以内	8回以内	

【使用上の注意】



1. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
2. 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
3. 使用に当っては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意してください。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分に確認してから使用してください。病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。
4. 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
5. 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
6. 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
7. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

【貯蔵上の注意】

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥し子供の手の届かない場所に密封して保管してください。