

令和7年12月吉日

各 位

O A T アグリオ株式会社

「サフオイル乳剤」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫殺ダニ剤「サフオイル乳剤」が令和7年12月10日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

記

商品名 : サフオイル乳剤（第22801号）

有効成分・% : 調合油（サフラワー油及び綿実油の合量として）……………97.0%

登録年月日 : 令和7年12月10日（適用拡大）

〈1〉適用内容の変更：

- 作物名「茶」（カンザワハダニ、チャノナガサビダニ）を追加する。
- 作物名「野菜類（いちご、トマト、ミニトマトを除く）」、「いちご」、「トマト」および「ミニトマト」の適用病害虫名「コナジラミ類」の希釀倍数を「300～500倍」に変更する。

【変更後】（変更する作物のみ抜粋）

作物名	適用病害虫名	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	調合油を含む農薬の総使用回数
野菜類 (いちご、 トマト、ミ ニトマト を除く)	ハダニ類 アブラムシ類 コナジラミ類 チャノホコリダ ニ うどんこ病	300～ 500倍 300倍	100～ 500 L/10a	収穫前 日 まで	—	散布	—

作物名	適用病害虫名	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	調合油を含む農薬の総使用回数
いちご	アブラムシ類 コナジラミ類	300～ 500 倍	100～ 500 L/10a	収穫前 日 まで	—	散布	—
	ハダニ類					2～10秒 間 苗浸漬	
	チャノホコリダ ニ うどんこ病	300 倍	100～ 500 L/10a	収穫前 日 まで		散布	
トマト ミニトマト	ハダニ類 アブラムシ類 コナジラミ類	300～ 500 倍				—	
	チャノホコリダ ニ トマトサビダニ うどんこ病	300 倍					
茶	カンザワハダニ チャノナガサビ ダニ	300～ 500 倍	200～ 400 L/10a	摘採 14 日前 まで	—	—	—

<2>注意事項等の変更

農薬登録申請書第 10 項

【変更】

浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。

以上

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釗倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	調合油を含む農薬の総使用回数
かんきつ	ミカンハダニ	500 倍	200～700 L/10a	収穫前日 まで		散布	
	サビダニ類	300 倍					
野菜類 (いちご、トマト、ミニトマトを除く)	ハダニ類 アブラムシ類 コナジラミ類	300～500 倍	100～500 L/10a			散布	
	チャノホコリダニ うどんこ病	300 倍					
いちご	アブラムシ類 コナジラミ類	300～500 倍	100～500 L/10a	定植前		2～10 秒間 苗浸漬	—
	ハダニ類	300 倍					
トマト ミニトマト	ハダニ類 ア布拉ムシ類 コナジラミ類	300～500 倍	100～500 L/10a	収穫前日 まで		散布	—
	チャノホコリダニ トマトサビダニ うどんこ病	300 倍					
とうもろこし	ハダニ類	300～500 倍	200～400 L/10a	摘採 14 日 前まで		散布	—
茶	カンザワハダニ チャノナガサビダニ						
花き類・観葉植物 (きくを除く)	ハダニ類		100～500 L/10a	発生初期			
きく	300 倍	—	定植前				

10. 水産動植物に有毒な農薬については、その旨

浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。