

(販売終了/最終年限：2026年10月)

殺線虫剤 登録番号 第20533号
ラグビーMC粒剤
(カズサホスマイクロカプセル剤)



- 有効成分 カズサホス 3.0%
- 性状 淡灰色細粒
- 毒性 普通物
- 有効年限 3年
- 包装 5kg×4袋/ケース 10kg×1袋
- 化管法 カズサホス(1種) 3.0%

[特 長]

1. センチュウ類に高い効果を示します。
2. 土壌害虫にも効果を示します。
3. マイクロカプセル製剤ですので長い期間高い効果が持続します。
4. 粒剤なので、処理・取扱いが簡単です。
5. ガス抜き作業の必要はありません。

[適用害虫と使用方法]

作物名	適用害虫名	使用量 (10a当り)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	カズサホスを 含む農薬の 総使用回数
だいこん	キスジノミハムシ	20~30kg	は種前	1回	全面処理土壌混和	1回
	ネコブセンチュウ	20kg				
	ネグサレセンチュウ	10~30kg				
きゅうり すいか メロン トマト ミニトマト なす	ネコブセンチュウ	20~30kg	定植前			
さといも	ネグサレセンチュウ	20~30kg	植付前			
	コガネムシ類	20kg				
かんしょ	ネコブセンチュウ	10~30kg				
	ハリガネムシ類	20~30kg				
	コガネムシ類	9kg				
キャベツ いちご	ネグサレセンチュウ	20kg	定植前	全面処理土壌混和		
ほうれんそう みずな	ネコブセンチュウ		は種前			
ねぎ	ネコブセンチュウ ネダニ類		定植前			

作物名	適用害虫名	使用量 (10a当り)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	カズサホスを含む農薬の 総使用回数		
ばれいしょ	ジャガイモシストセンチュウ	20kg	植付前	1回	全面処理土壌混和	1回		
えだまめ	ダイズシストセンチュウ		は種又は定植前					
だいず			は種前					
しそ （ピーマン ししとう）			定植前					
しそ(花穂)	ネコブセンチュウ		仮植前			1回	全面処理土壌混和	2回以内 (仮植前では1回以内、 本圃では1回以内)
			定植前					
しょうが			植付前					
ごぼう	ネグサレセンチュウ	30kg	は種前	1回	全面処理土壌混和			
きく			植付前					
トルコギキョウ	ネコブセンチュウ	30kg	植付前	1回	全面処理土壌混和			

【上手な使い方】

1. ムラなく均一に散布
定植(播種)前に土壌全面に均一に散布してください。
2. 十分に混和
薬剤が土壌中にいきわたるよう、20cm 程度の深さまで、ムラなく十分混和してください。
3. 土壌水分に注意
手で土壌を握って、崩れない程度の土壌水分が最適です。

【使用上の注意】

- 1 はり合わせアルミはく袋入りの製品については、開封前に袋が固化している場合があるが、開封後は解消し、品質には問題ありません。
2. 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
3. 播種前、定植前または植付前に圃場全体に均一に散布し、10～20cm の深さに土壌と十分混和してください。
4. 散布が不均一であったり、混和が不十分な場合には薬効不足や初期生育の遅延、生育不良等の被害を生じるおそれがあるので注意してください。
5. 一時に広範囲に使用する場合は、散布器具は飛散が少なく、均一に散布できる乗用トラクター装着粒剤施用機を用いてください。
6. 桑に付着するおそれがある地域では使用しないでください。
7. ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
8. ハウス栽培で使用し、ミツバチまたはマルハナバチを導入する場合、散布直後には活動に影響を及ぼすおそれがあるので、処理後30日以上たってから導入してください。
9. 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
10. 有機りん剤の解毒剤としては、硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤があります。本剤では硫酸アトロピン製剤を使用してください。

11. かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意してください。
12. 水産動物(魚類、甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
13. 散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さないでください。また空袋等は、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

[貯蔵上の注意]

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥し子供の手の届かない場所に密封して保管してください。