



殺虫剤分類 11A

期待の液体!

もっと使いやすいBT剤へ
トアローフロアブル



特長

- チョウ目害虫(チョウ・ガ)の幼虫を選択的に防除。
- 蜜蜂・訪花昆虫・天敵に影響が少ない。
- 日本農林規格有機農産物(JAS1605:2024)の付属書B(規定)表B.1に適合する農薬。

農林水産省登録第20056号

野菜類の
コナガ・アオムシ・オオタバコガの防除に

トアロー[®]フロアブルCT

殺芽胞BT剤

トアローはOATアグリオ(株)の登録商標

野菜類の
コナガ・アオムシ・
オオタバコガの防除に
トアロー[®]フロアブルCT

成分・性状

〔有効成分〕 バチルス チューリンゲンシス菌の産生する結晶毒素
(力価70B.m.t.x.単位/mg)…………… 7.0%

〔性状〕 淡褐色水和性粘稠懸濁液体

〔毒性及び劇物取締法〕 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

※2026年1月現在の登録内容

適用害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BTを含む農薬の総使用回数
野菜類	アオムシ コナガ	1000~2000	発生初期 但し 収穫前日まで	-	散布	-
	オオタバコガ	500~1000				
のざわな	ヨトウムシ	500	発生初期	-	-	-
さくら	アメリカシロヒトリ	1000				
つばき類	チャドクガ					
芝	シバツトガ スジキリヨトウ	500~1000				

POINT 遅効性のため、虫はすぐには死にませんが、食害は散布後すぐに止まります。

 使用上の注意事項 

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布液調製時には、使用直前に容器をよく振ってください。
- 使用に当たっては、展着剤を加用してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性の強い薬剤とは混用しないでください。
- 若令幼虫に有効なので、若令幼虫期に時期を失せず散布してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種にはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 誤飲に注意してください。もし誤って飲み込んだ場合は吐き出した上、医師の診察を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものと分けて洗濯してください。

- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

 カイコ注意

蚕に対する毒性があるので、養蚕地帯及び養蚕農家、共同飼育場などの周辺では使用しないでください。また、これら以外の場所でも付近に桑園がある場合は飛散してかからないよう、風向きなどに十分注意して散布してください。なお、使用に当たっては、散布地域の使用規制に従ってください。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。

貯蔵上の注意

密栓し、直射日光を避け、食品と区別してなるべく低温で子供の手の届かない場所に密栓して保管してください。

★ラベルをよく読む。 ★記載以外には使用しない。 ★小児の手の届く所には置かない。 ★空容器は圃場などに放置せず、適切に処理する。 ★防除日誌を記帳する。

取扱い

 OAT アグリオ株式会社
https://www.oat-agrio.co.jp/
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1

コールセンター
050-1724-6881
(9:00~12:00・13:00~17:00 土日 祝日を除く)