

各 位

OATアグリオ株式会社

「オーシャインフロアブル」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺菌剤「オーシャインフロアブル」が令和8年6月24日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : オーシャインフロアブル (第22627号)
 有効成分・% : オキシポコナゾールフマル酸塩 20.0%

登録年月日 : 令和8年6月24日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更:

- ・ 作物名「かんきつ (みかんを除く)」および「みかん」の適用病害虫名に「貯蔵病害 (青かび病)」を追加する。
- ・ 作物名「小粒核果類 (うめを除く)」の適用病害虫名に「黒星病」を追加する。

【変更後】 (変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	オキシポコナゾール フマル酸塩を含む農薬の総 使用回数
かんきつ (みかんを除く)	灰色かび病 そうか病 貯蔵病害 (緑かび病) 貯蔵病害 (青かび病)	2000 倍	200~ 700 L/10a	収穫7日前 まで	5 回以内	散布	5 回以内
みかん				収穫前日ま で			
小粒核果類 (うめを除く)	灰星病 黒星病	3000 倍			3 回以内		3 回以内

<2>注意事項等の変更
 なし

以上

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	キスポコナゾー ルフル酸塩を 含む農薬の 総使用回数
りんご	赤星病 黒星病 モニリア病 うどんこ病	2000～3000 倍	200～ 700 L/10a	収穫7日前 まで	5回以内	散布	5回以内
かんきつ (みかんを 除く)	灰色かび病 そうか病 貯蔵病害 (緑かび病)	2000倍		収穫前日 まで			
みかん	貯蔵病害 (青かび病)						
おうとう	灰星病 幼果菌核病 褐色せん孔病	3000倍		収穫前日 まで	3回以内		
小粒核果類 (うめを除 く)	灰星病 黒星病						
うめ	黒星病	2000～3000倍		収穫前日 まで			
	すす斑病	2000倍					
	灰星病	3000倍					
もも	灰星病 黒星病	2000～3000倍		収穫前日 まで			
	ホモプシス腐 敗病	1000～2000 倍					
ネクタリン	灰星病 黒星病	2000～3000倍	収穫前日 まで				
	ホモプシス腐 敗病						
ぶどう	うどんこ病 灰色かび病 黒とう病 褐斑病	2000倍	収穫7日前 まで	2回以内	2回以内		
なし	赤星病 黒星病	3000倍	収穫前日 まで	5回以内	5回以内		