

各 位

OATアグリオ株式会社

「サフオイル乳剤」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫殺ダニ剤「サフオイル乳剤」が令和8年6月10日付にて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : サフオイル乳剤 (第 22801 号)
 有効成分・% : 調合油 (サフラワー油及び綿実油の含量として) 97.0%
 登録年月日 : 令和8年6月10日 (適用拡大)

<1>適用内容の変更:

- ・ 作物名「きゅうり」の適用病害虫名に「アザミウマ類」を追加し、作物名「野菜類 (いちご、トマト、ミニトマトを除く)」を「野菜類 (きゅうり、いちご、トマト、ミニトマトを除く)」に変更する。

【変更後】 (変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	調合油を含む農薬の総使用回数
野菜類 (きゅうり、いちご、トマト、ミニトマトを除く)	ハダニ類 アブラムシ類 コナジラミ類	300~500倍	100~500 L/10a	収穫前日まで	—	散布	—
	チャノホコリダニ うどんこ病	300倍					
きゅうり	ハダニ類 アブラムシ類 コナジラミ類	300~500倍					
	チャノホコリダニ アザミウマ類 うどんこ病	300倍					

<2>注意事項等の変更

なし

以上

【変更後】

作物名	適用病虫害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	調合油を含む農薬の総使用回数				
かんきつ	ミカンハダニ	500倍	200～700 L/10a	収穫前日まで	—	散布	—				
	サビダニ類	300倍									
野菜類 (きゅうり、いちご、トマト、ミニトマトを除く)	ハダニ類 アブラムシ類 コナジラミ類	300～500倍	100～500 L/10a								
	チャノホコリダニ うどんこ病	300倍									
きゅうり	ハダニ類 アブラムシ類 コナジラミ類	300～500倍	100～500 L/10a								
	チャノホコリダニ アザミウマ類 うどんこ病	300倍									
いちご	アブラムシ類 コナジラミ類	300～500倍	—					定植前	—	2～10秒間 苗浸漬	—
	ハダニ類										
	チャノホコリダニ うどんこ病	300倍									
トマト ミニトマト	ハダニ類 アブラムシ類 コナジラミ類	300～500倍	100～500 L/10a					収穫前日まで	—	散布	—
	チャノホコリダニ トマトサビダニ うどんこ病	300倍									
とうもろこし	ハダニ類	300～500倍	200～400 L/10a	摘採14日前まで	—	散布	—				
茶	カンザワハダニ チャノナガサビダニ										
花き類・観葉植物 (きくを除く)	ハダニ類							100～500 L/10a	発生初期		
きく		300倍	—	定植前	10秒～1分間 挿し穂浸漬						