

殺菌剤

農林水産省登録
第23575号

殺菌剤分類 19

ジオゼット®

®は科研製薬(株)の登録商標

水和剤

熊本阿蘇から生まれた天然物質農薬



アソエンス®
環境保全型農業に

ブロッコリー
[黒すす病]



ブロッコリー 黒すす病

キチン合成阻害
既存薬剤耐性菌にも有効



にら 白絹病



ねぎ 白絹病



きゅうり うどんこ病



キャベツ 株腐病



レタス すそ枯病

病害写真提供:HP埼玉の農作物病害虫写真集

病害写真提供:長野県野菜花き試験場 小木曾 秀紀



OAT アグリオ株式会社

殺菌剤

ジオゼット®

水和剤

成分: ポリオキシシンD亜鉛塩・・・2.25% (ポリオキシシンDとして 20,000 PsDu/g)
鉱物質微粉、界面活性剤等・・・97.75%有効年限: 6年 人畜毒性: 普通物※
包装規格: 500g袋×20袋 1kg袋×20袋

殺菌剤分類 19

※「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

特長

- 1 リゾクトニア病害に優れた予防・治療効果を示します。
- 2 独自の作用性(キチン生合成阻害)で既存薬剤の耐性菌にも有効です。
- 3 他の作用性の異なる薬剤とのローテーション散布に適しています。
- 4 有効成分は微生物由来の天然物質成分であり、化学合成農薬ではありません。


適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ポリオキシシンDを含む農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病 灰色かび病	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
キャベツ	株腐病			収穫 14日前まで	3回以内		
ブロッコリー	黒すす病			500倍			
レタス	すそ枯病	1000倍		収穫 14日前まで			
非結球レタス	灰色かび病	500倍					
ねぎ	黒斑病 さび病 葉枯病	1000倍					
		500倍					
にら	白絹病	500～ 1000倍		収穫前日まで			
アスパラガス	茎枯病 斑点病	500倍	100～400ℓ /10a	発病初期	8回以内		8回以内
きく	立枯病		100～300ℓ /10a				

試験成績


ブロッコリー 黒すす病

- 試験場所: 福島県農業総合センター 2021年
- 品 種: ピクセル
- 1区 9.6m² 30株 3連制
- 発生状況: 中発生(接種)
- 散布日: 9/15、9/21、9/29
- 処理量: 300ℓ/10a
- 調査日: 10/6(最終散布7日後)
- 薬害(汚れ): 一(一)




ねぎ 白絹病

- 試験場所: 日本植物防疫協会 宮崎試験場 2018年
- 品 種: ホワイツリー
- 1区 3.2m² 70株 3連制
- 発生状況: 中発生(接種)
- 散布日: 8/30(発病初期)
- 処理量: 210ℓ/10a
- 調査日: 9/21(最終散布22日後)
- 薬害(汚れ): 一(一)
- 展着剤マイリノー5000倍加用




キャベツ 株腐病

- 試験場所: 奈良県植物防疫協会 2013年
- 品 種: 初秋
- 1区 6.4m² 42株 3連制
- 発生状況: 多発生(接種)
- 散布日: 5/31、6/12、6/24、7/4
- 処理量: 150~200ℓ/10a
- 調査日: 7/18(最終散布14日後)
- 薬害(汚れ): 一(一)



アスパラガス 茎枯病

- 試験場所: 岩手県植物防疫協会 2021年
- 品 種: スーパーウェルカム
- 1区 7.5m²
- 3反復 露地栽培
- 発生状況: 多発生
- 散布日: 8/17、8/23、8/31、9/7
- 処理量: 350ℓ/10a(背負式動噴)
- 調査日: 9/15(最終散布8日後)
- 薬害(汚れ): 一(一)



科研のエコ農薬

本剤の特別栽培農産物に対する取り組み

本剤は化学合成農薬ではなく、土壌放線菌を発酵技術を利用して生産した天然物質農薬であり、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」において節減対象農薬から除外することが可能です(それぞれの地方自治体等が独自に定める農薬使用基準においては除外されない場合があります)。



アソエンシス®は有効成分の一般名「ポリオキシシンD亜鉛塩」のブランド名

本成分は熊本県阿蘇の土壌から分離された土壌放線菌 *Streptomyces cacaoi* var. *asoensis* を由来とする名称です。

この資料は2026年3月末現在の登録内容に基づいたものです。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。●空袋は圃場などに放置せず適切に処理してください。

ジオゼット水和剤の
技術情報が
ご覧いただけます。

OAT アグリオ株式会社
https://www.oat-agrio.co.jp/
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1

コールセンター: 050-1724-6881 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日をのぞく)