

亜りん酸粒状肥料

粒状で撒きやすい! 品質向上・収量アップ!



期待される効果及び特長

- 健康な苗を育成します!
- 品質向上・収量アップ!
- 粒状で撒きやすい!
- 根群充実・根張り向上!
- 夏越し・冬越しの樹勢強化!
- 液体タイプより長く効く!

亜りん酸粒状肥料の内容

製品名 (登録番号)	保証成分(%)			包装
	く溶性りん酸	内水溶性りん酸	水溶性加里	
亜りん酸粒状1号 (生第89343号)	7.0	4.0%	5.0	10kg(ポリ袋)
亜りん酸粒状2号 (生第89454号)	—	10.0	7.0	10kg(ポリ袋)

特長と使い分け

亜りん酸粒状1号

★長期溶出型なので、育苗期間が長い、あるいは栽培期間が長い作物に適する。

- ・黒大豆の育苗時と土寄せ時施用の体系
- ・ネギの育苗時施用
- ・ラッキョウの植え付け時施用 など

亜りん酸粒状2号

★すぐに効かせたい場面(土寄せ時及び夏越し・冬越し準備)でのスポット施用に適する。

- ・水稻の播種時及び育苗時施用
- ・ネギの土寄せ時及び夏越し施用
- ・ブロッコリーの土寄せ施用 など

使用方法

亜りん酸粒状1号

作物	使用時期	目的	使用量	使用方法
豆 類	播種時～定植～着蕾期	健 苗 育 成 増 収 効 果 品 質 向 上 根 群 充 実 樹 勢 強 化	・育苗セルトレイ処理 使用土壌1畝当たり3～10g ・本圃処理 2～30kg/10a	・育苗セルトレイ処理 土壌混和または育苗セル トレイの上から均一散布 ・本圃処理 株元散布または植穴土壌混和
果菜類	播種時～定植～生育期			
葉菜類	播種時～定植～生育期			
根菜類	播種時～定植～肥大期			
芝	張替時、更新作業時	根 群 充 実 根 張 り 向 上	10～20g/m ²	散布

亜りん酸粒状2号

作物	使用時期	目的	使用量	使用方法
豆 類	定植～着蕾期	増 収 効 果 品 質 向 上 根 群 充 実 樹 勢 強 化	5～30kg/10a	株元散布または植穴土壌混和
果菜類	定植～生育期			
葉菜類	定植～生育期			
根菜類	定植～肥大期			
水 稻	播種時	健 苗 育 成 増 収 効 果 品 質 向 上 根 群 充 実 樹 勢 強 化	育苗箱 (30×60×3cm 使用土壌約5畝)	床土または覆土に均一混和
	育苗時		1箱当たり20～30g	育苗箱の上から均一散布

※処理量は作型・作物・土壌状態により、適宜加減してください。

※土壌混合の場合は、混合ムラのないように均一に混合してください。

※育苗箱及び育苗セルトレイの上から散布する場合は均一に散粒し、葉に付着した粒を払い落とし、軽く散水してください。

※多量に処理すると生育が抑制される場合があります。使用量に注意してください。

※育苗セルトレイ処理の場合、該当作物又はその新品種に本粒状肥料をはじめて使用する場合は、事前に生育抑制などの有無を十分確認してから使用してください。



使用上・保管上の注意

1. アルカリ性資材とは混用しないでください。
2. 肥料以外の用途には使用しないでください。
3. 幼児等の手の届かない場所に保管してください。
4. 開封したまま放置すると吸湿しますので、袋の口を密封してください。
5. 直射日光をさけ、冷暗所で荷崩れが起こらないように保管してください。
6. 使用後は洗眼やうがいをし、皮ふに付着した場合は洗い流してください。
7. 眼に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
8. 誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
9. 石灰硫黄合剤と混合すると、有毒なガスが発生するおそれがあり、危険ですから混用しないでください。
10. 多量に与えると植害が発生する場合がありますので、散布量に注意してください。

11. 処理量は作型・作物・土壌状態により、適宜加減してください。
12. 土壌混合の場合は、混合ムラのないように均一に混合してください。
13. 高温・乾燥・多湿条件など、不適切と思われる条件での散布はさけてください。
14. 育苗箱及び育苗セルトレイの上から散布する場合は均一に散粒し、葉に付着した粒を払い落とし、軽く散水してください。
15. 育苗セルトレイ処理に際し、該当作物又はその新品種に本肥料を初めて使用する場合は、事前に生育抑制などの有無を十分確認してから使用してください。
16. 亜りん酸粒状2号は製品の性質上袋内で固化することがありますが、品質上問題ありませんのでほぐしてから使用してください。
17. 空容器は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

■取扱い