

令和8年7月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「ハチハチ乳剤」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチ乳剤」が令和8年7月8日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ハチハチ乳剤 (第20818号)

有効成分・% : トルフェンピラド 15.0%

登録年月日 : 令和8年7月8日 (適用拡大)

〈1〉適用内容の変更：

- ・ 適用病害虫の追加：キャベツ／シロイチモジヨトウ (1000倍)
- ・ 適用病害虫の追加：キャベツ／ナメクジ類 (1000倍)
- ・ 適用病害虫の追加：にら／ネギアザミウマをアザミウマ類に変更

【変更後】 (変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ ナメクジ類	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内
	ハイマダラノメイガ コナガ アオムシ アブラムシ類	1000～ 2000倍					
にら	アザミウマ類	1000倍	100～ 300ℓ/10a		1回		1回

〈2〉注意事項等の変更

なし

以上

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アザミウマ類、シロイチモジヨトウ、ナメクジ類	1000 倍	100～300 L/10a	収穫 14 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
はくさい	ハイマダラノメイガ、コナガ、アオムシ、アブラムシ類	1000～2000 倍					
	ナメクジ類	1000 倍					
レタス	アブラムシ類、ナモグリバエ	1000～2000 倍					
	ナメクジ類、べと病	1000 倍					
だいこん	アオムシ、コナガ アブラムシ類、キスジノミハムシ、ハイマダラノメイガ、ナモグリバエ、カブラハバチ、ダイコンハムシ、白さび病、ワッカ症	2000 倍		収穫 30 日前 まで	1 回		1 回
かぶ	キスジノミハムシ、コナガ、ハイマダラノメイガ、ナモグリバエ、アブラムシ類						
きゅうり	ウリノメイガ、アブラムシ類、アザミウマ類、コナジラミ類	1000～2000 倍		収穫前日 まで	2 回以内		2 回以内
		うどんこ病、べと病、褐斑病					
にがうり らっきょう	アザミウマ類						
たまねぎ	べと病、ネギハモグリバエ	1000～2000 倍					
	アザミウマ類						
すいか	アブラムシ類、アザミウマ類	1000 倍					
	コナジラミ類、うどんこ病	1000 倍					
ばれいしょ	アブラムシ類、ナストビハムシ	2000 倍					
やまのいも	アブラムシ類、ナガイモコガ、葉渋病	1000 倍					
ねぎ	アザミウマ類、アブラムシ類、ネギハモグリバエ、クロバネキノコバエ類、ネギコガ、シロイチモジヨトウ、さび病、べと病						
ブロッコリー	アオムシ、アブラムシ類、コナガ		1000～2000 倍				
ピーマン	アザミウマ類	1000 倍	収穫前日 まで	1 回	1 回		
	チャノホコリダニ、コナジラミ類、うどんこ病						

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数
にんにく	ネギコガ、チューリップサビダニ、アザミウマ類、アブラムシ類、さび病			収穫 7 日前まで	2 回以内		2 回以内
にら	アザミウマ類	1000 倍	100～300 L/10a	収穫 14 日前まで	1 回	散布	1 回
茶	チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ、チャノホコリダニ、チャノナガサビダニ	1000～1500 倍	200～400 L/10a	摘採 14 日前まで			
	チャトゲコナジラミ、マダラカサハラハムシ、ツマグロアオカスミカメ						
きく	アブラムシ類、アザミウマ類、ハモグリバエ類	1000 倍	100～300 L/10a	発生初期	4 回以内		4 回以内
	白さび病			発病初期			
しきみ	アザミウマ類		100～700 L/10a	発生初期			