

令和8年7月吉日

各 位

OATアグリオ株式会社

「ハチハチフロアブル」適用拡大のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご協力を賜りました殺虫剤「ハチハチフロアブル」が令和8年7月8日付けにて適用拡大登録となりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後とも、皆様のご指導ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : ハチハチフロアブル (第21056号)

有効成分・% : トルフェンピラド 15.0%

登録年月日 : 令和8年7月8日 (適用拡大)

＜1＞適用内容の変更：

- (1) 希釈倍数の変更：かんきつ/ナメクジ類の希釈倍数「1000倍」を「1000～2000倍」に変更。

【変更後】 (変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数
かんきつ	サビダニ類	2000 ～ 3000 倍	200 ～ 700L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	アブラムシ類、チャノホリダニ、カネタキ	2000 倍					
	アザミヤカ類、ナメクジ類	1000 ～ 2000 倍					
	ゴマダラカミキリ、コナカイラムシ類、コナジラミ類、ミカンキジラミ、ヨモギエダシヤク、ヨコバイ類、ミカンハエ成虫	1000 倍					

＜2＞注意事項等の変更

なし

【変更後】

作物名	適用病虫害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数
なし	アブラムシ類、ニセナシサビダニ、アザミウマ類、クワコナカイガラムシ、チュウゴクナシキジラミ	2000倍	200～700 L/10a	収穫 30 日前まで	1 回	散布	1 回
なし(苗木)	アブラムシ類、ニセナシサビダニ、アザミウマ類、チュウゴクナシキジラミ		100～700 L/10a	育苗期	2回以内		
かんきつ	サビダニ類	2000～3000倍	200～700 L/10a	収穫前日まで			
	アブラムシ類、チャノホコリダニ、カネタタキ	2000倍					
	アザミウマ類、ナメクジ類	1000～2000倍					
	ゴマダラカミキリ、コナカイガラムシ類、コナジラミ類、ミカンキジラミ、ヨモギエダシャク、ヨコバイ類、ミカンバエ成虫	1000倍					
すもも	アブラムシ類	2000倍		収穫14日前まで			
もも ネクタリン	シンクイムシ類	1000～2000倍		収穫前日まで			
	クビアカツヤカミキリ			成虫発生期但し、収穫前日まで			
	アブラムシ類、モモハモグリガ、モモサビダニ	2000倍		収穫前日まで			
	アザミウマ類	1000倍					
さやえんどう 実えんどう	ナモグリバエ	1000～2000倍		収穫前日まで			
	うどんこ病	1000倍					
キャベツ	コナガ、アオムシ、アブラムシ類、ハイマダラノメイガ、アザミウマ類		100～300 L/10a	収穫14日前まで			
はくさい	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、キスジノミハムシ、ダイコンハムシ、ナメクジ類						
	アブラムシ類						

作物名	適用病虫害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トルフェンピラドを含む農薬の総使用回数			
レタス	アブラムシ類、ナモグリバエ	1000～2000倍	100～300 L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内			
	ヒメフタテンヨコバイ、ナメクジ類	1000倍								
非結球レタス	アブラムシ類、ナモグリバエ	2000倍		収穫30日前まで	1回		1回			
セルリー										
カリフラワー	コナガ、アブラムシ類	1000倍		収穫3日前まで	2回以内		2回以内			
いちご	アブラムシ類、アザミウマ類、カキノヒメヨコバイ、チャノホコリダニ、クロバネキノコバエ類、うどんこ病			1番花の開花まで	1回		1回			
すいか	アブラムシ類	1000～2000倍	100～800 L/10a	収穫前日まで	2回以内			2回以内		
	アザミウマ類、うどんこ病									
アスパラガス	ネギアザミウマ、アブラムシ類、コナジラミ類、ジュウシホシクビナガハムシ、ツマグロアオカスミカメ	1000倍								
しょくようほおずき	コナジラミ類	2000倍	100～300 L/10a							
茶	チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホコリダニ、チャノナガサビダニ	1000～1500倍	200～400 L/10a	摘採14日前まで	1回			1回		
	マダラカサハラハムシ、チャトゲコナジラミ	1000倍								
花き類・観葉植物	アザミウマ類			100～300 L/10a	発生初期		4回以内		4回以内	
チューリップ	アブラムシ類	1000～2000倍	300L/10a	3回以内						
	チューリップサビダニ	500倍	—	掘取後～植付前	1回	15分間球根浸漬				