



殺虫剤分類 1A

オンコル[®] 粒剤 5

オンコルはOATアグリオ(株)の登録商標

水稲・野菜・花き類に
殺虫剤のロングセラー



特長

1.優れた浸透移行性

有効成分が作物全体に速やかに浸透移行し、生長の盛んな部分を含め作物全体を害虫の被害から守ります。

2.効果が長期間持続

水稲の育苗箱散布でイネミズゾウムシに対する効果は40～50日間期待できます。また、とうがらし類のミナミキイロアザミウマ、きくのみかんキイロアザミウマに対しても高い効果が期待できます。

3.広範囲の害虫に有効

幅広い殺虫スペクトラムを有しているため、水稲・野菜・花き・たばこ等の広範囲の害虫に有効です。

4.抵抗性害虫にも有効

安定した殺虫力を持ち、抵抗性害虫に対しても有効なロングセラー殺虫剤です。



OATアグリオ株式会社

水稻にも園芸にも 殺虫剤のロングセラー

オンコル® 粒剤 5

【有効成分】：ベンフラカルブ 5.0% 【毒物及び劇物取締法】：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
【有効年限】：4年 【包装】：500g×40袋(ケース)：3kg×8袋(ケース)

●適用害虫の範囲及び使用方法

2026年7月現在の登録内容

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンフラカルブを含む農薬の総使用回数	
稲 (箱育苗)	イネミズゾウムシ イネドロオイムシ イネヒメハモグリバエ イネハモグリバエ	育苗箱* 1箱当り30～60g	移植前3日 ～移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する。	1回	
		高密度には種する場合は 0.6～1.2kg/10a (育苗箱* 1箱当り30～120g)	移植当日				
	ツマグロヨコバイ ヒメトビウンカ セジロウンカ	育苗箱* 1箱当り50～80g	移植前3日 ～移植当日				
		高密度には種する場合は 1～1.6kg/10a (育苗箱* 1箱当り50～160g)	移植当日				
	イネシガラレセンチュウ	育苗箱* 1箱当り60g	移植前3日 ～移植当日				
		高密度には種する場合は 1.2kg/10a (育苗箱* 1箱当り60～120g)	移植当日				
	とうがらし類	ミナミキイロアザミウマ	0.5g/株				育苗期後半 又は定植時
	ひろしまな	アオムシ モモアカアブラムシ	1g/株				育苗期後半
メキャベツ 非結球メキャベツ	アブラムシ類	定植時					
らっかせい	コガネムシ類幼虫	9kg	は種時	全面土壌混和			
さといも		6～9kg	生育期 但し、 収穫60日前まで	株元土壌混和			
	アブラムシ類		植付時	植溝土壌混和	3回以内 植付時の土壌混和は 1回以内、 培土時の土壌混和及び 株元散布は合計1回以内、 散布は1回以内		
さとうきび	コガネムシ類幼虫 ハリガネムシ類 メイチュウ類	9kg		株元散布又は 株元土壌混和			
	コガネムシ類幼虫 メイチュウ類		培土時				
	カンシャコバネナガカメムシ	4～6kg	収穫100日前 まで	散布			
飼料用さとうきび	コガネムシ類幼虫 ハリガネムシ類 メイチュウ類	6～9kg	植付時	植溝土壌混和	1回		
	コガネムシ類幼虫 メイチュウ類	9kg	培土時	株元散布又は 株元土壌混和			
	コガネムシ類幼虫 メイチュウ類	4～6kg					
	花き類・観葉植物 (きく、ストックを除く)	アザミウマ類	6kg	生育期		3回以内	株元散布
きく	ミナミキイロアザミウマ	6～9kg	定植時	1回	植溝土壌混和 又は株元散布		
	ミカンキイロアザミウマ	9kg	生育期	3回以内	株元散布		
ストック	コナガ	0.5g/株	定植時	1回	全面土壌混和		
	アザミウマ類				株元散布		
樹木類 (つつじ類を除く)	アブラムシ類	6kg	生育期	3回以内			
つつじ類	コガネムシ類幼虫	9kg			定植時	1回	全面土壌混和 又は株元土壌混和
	たばこ	アブラムシ類	6kg	1回			作条土壌混和
アザミウマ類		3～6kg					

* 育苗箱は30×60×3cm、使用土壌約5ℓ

●ラベルをよく読む。●記載以外には使用しない。●小児の手の届く所には置かない。●使用量に合わせて秤量し、使いきる。●空袋は圃場などに放置せず、適切に処理する。●防除日誌を記帳する。

取扱い

 **OAT アグリオ株式会社**
<https://www.oat-agrio.co.jp/>
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1
コールセンター：050-1724-6881 (9:00～12:00・13:00～17:00)
土日・祝日も承ります