

キャベツ・ばれいしょの 雑草防除に!!

除草剤・植物成長調整剤

シアノット®

シアン酸塩水溶剤

- 効果が早く現われます。
- 土壌中で速やかに分解します。

シアノットはOATアグリオ(株)の登録商標



OAT アグリオ株式会社



特長

- 1.速効性:**効果が早く現われます。
- 2.早い分解性:**効果発現後、有効成分は速やかに二酸化炭素とアンモニアに分解されます。
- 3.移行性なし:**接触により効果を発現し、作物体への浸透移行性がありません。

適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量(10a当り)		本剤の使用回数	使用方法	シアン酸ナトリウムを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
ばれいしょ	—	畑地 一年生雑草	雑草生育初期	3kg	100ℓ	2回以内	畦間茎葉散布	3回以内 （ばれいしょの茎葉へ） 散布は1回以内
キャベツ			雑草生育期 (草丈5cm以下) 定植後畦間処理			1回	雑草茎葉散布	1回
球根花き 花木				5～15g /3.3m ²			株間散布	
桑 こうぞ みつまた								
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地等		雑草生育初期	3～4.5kg	70～100ℓ	3回以内	植栽地を除く 樹木等の周辺 地に雑草茎葉 散布	3回以内

作物名	使用目的	使用量(10a当り)		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアン酸ナトリウムを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
ばれいしょ	茎葉枯凋	2~3kg	100ℓ	茎葉黄変期	1回	ばれいしょの 茎葉へ散布	3回以内 (ばれいしょの茎葉へ散布は1回以内)

2026年7月現在の登録内容

⚠ 使用上の注意事項

- 除草剤として使用する場合は、以下のことに注意してください。
 - ①使用濃度は最低2~3%液とし雑草の幼少時(草丈10cm以内の時期)に散布してください。
草丈が大きい場合には適宜薬量と散水量とを増やしてください。
 - ②作物に薬液が付着すると薬害を生じるので、薬液が作物にかからないように十分注意して散布してください。
 - ③作物の幼苗時の使用はさけてください。
 - ④本剤の所要量を10アール当り70~100ℓの水に加え、十分かき混ぜた後、散布機またはジョロで散布してください。
- ばれいしょの枯凋剤として使用する場合、高温が続く場合の散布や乾燥になりやすい土壌での使用はさけてください。
- 降雨や降雨前後の散布はさけてください。
- 散布液の飛散あるいは本剤の流出によって、有用植物に薬害が生じることのないよう十分注意して散布してください。
- 蚕に影響があるので、桑葉にかからないように注意してください。
- 散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 公園、堤とう等で使用する場合、特に水源地、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。

- 散布器具、容器の洗浄水(及び残りの薬液)は河川等に流さず、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。
使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意してください。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用してください。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係ない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

⚠ 貯蔵上の注意事項

- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥し子供の手の届かない場所に密封して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空袋は圃場などに放置せず適切に処理してください。●防除日誌を記帳しましょう。