殺虫剤

登録番号　第20653号

フローバックDF

（BT 水和剤）



●**有効成分**　バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素　10.0%
（力価として 1000B.m.i 単位/mg）

●**性　　状**　褐色水和性細粒及び微粒

●**毒　　性**　普 通 物

●**有効年限**　5　　年

●**包　　装**　500g×20袋／ケース

［特　　長］

1．BT生菌剤（アイザワイ系）。
　ヨトウムシ、ハスモンヨトウなどのチョウ目害虫に対して高い効果を示します。

2．作物の収穫前日まで使用でき、使用回数制限がありません。

3．日本農林規格 有機農産物（JAS1605：2024）の附属書B（規定）表B.1に適合する農薬です。

［適用病害と使用方法］

作物名	適用病害虫名	希釈倍数（倍）	使用液量（10a当り）	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BTを含む農薬の総使用回数
果　樹　類	ケムシ類 ハマキムシ類	1000～2000	200～700 ℓ	発生初期 但し、 収穫前日まで	－	散布	－
野　菜　類	オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	1000	100～300 ℓ				
	アオムシ コナガ シロイチモジヨトウ	1000～2000					
だいこん チンゲンサイ ブロッコリー	ハイマダラノメイガ	1000					
キャベツ	ネギアザミウマ ハイマダラノメイガ						
	ウワバ類	1000～2000					
はくさい	ハイマダラノメイガ	1000					
レタス	ウワバ類	1000～2000					
にんにく	ネギコガ						
雑穀類（そばを除く）	アワノメイガ	2000					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数（倍）	使用液量（10a当り）	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BTを含む農薬の総使用回数
そば	ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000	100～300ℓ	発生初期 但し、 収穫前日まで	–	散布	–
飼料用とうもろこし	アワノメイガ						
花き類・観葉植物	オオタバコガ	1000		発生初期			

［使用上の注意］



1. 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
2. 使用に当たっては展着剤を加用してください。
3. アルカリ性の強い石灰硫黄合剤、ボルドー液などの農薬およびアルカリ性の強い葉面施用の肥料などとの混用はさけてください。
4. 若令幼虫に有効なので、若令幼虫期に時期を失せず散布してください。
5. 吸湿すると固化したり、効果が低下したりすることがあるので、貯蔵に当たっては湿気に注意し、特に使用残りの薬剤は密封して乾燥した冷暗所に貯蔵してください。
6. 空中散布には使用しないでください。
7. 適用作物群に属する作物又はその新品種にはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
8. 蚕に対する毒性があるので、養蚕主産県その他主要養蚕地帯及び養蚕農家、共同飼育場などの周辺では施用しないでください。また、これら以外の場所でも付近に桑園がある場合は、飛散してかからないよう風向等に十分注意して散布してください。なお、使用に当たっては、散布地域の使用規制に従ってください。特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
9. ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
10. 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
    眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
11. 皮ふに対して刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。
    付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
12. 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
    作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
13. 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
14. かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

［貯蔵上の注意］

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥し子供の手の届かない場所に密封して保管してください。