

ハスモンヨトウ



ヨトウムシ



コナガ

狙いの虫は



逃さない。

Natural Products

天然物由来の有効成分を使用しています。
有機農産物JAS規格、特別栽培農作物に係るガイドラインでの規定とは異なります。

ツマジロクサヨトウの防除に!!

※飼料用とうもろこし、未成熟とうもろこし及びとうもろこし(子実)のツマジロクサヨトウに対して登録はありませんが、植物防疫法第29条1項の規定による防除を行うために使用が可能です。
ご使用にあたっては、都道府県の病害虫防除所など指導機関にご確認ください。

微生物の力で作物を守る

フローバック®DF

(アイザワイ系生菌剤)

【成分】: バチルス・チューリンゲンシス菌の生芽胞および産生結晶毒素---------- 10.0%
糖類、界面活性剤等---------- 90.0%
【性状】: 褐色水和性細粒および微粒

フローバックは Sumitomo Biorational Company LLCの登録商標

ヨトウムシ類・コナガなどの害虫防除に

フローバック® DF

（アイザワイ系生菌剤）　殺虫剤分類 11A

農林水産省登録 第20653号

特　長

1 農薬の成分使用回数にカウントされません

微生物農薬なので、化学合成農薬の使用回数にカウントされません。また、有機JAS規格の定める有機農産物の生産にも使用可能です。

2 収穫前日まで使用可能

3 ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、コナガに有効

アイザワイ系のBT菌を使用し、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、コナガをはじめ多くの害虫に有効です。

適用作物・害虫と使用方法

2026年10月現在の登録内容


作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	BTを含む農薬の総使用回数
果樹類	ケムシ類、ハマキムシ類	1000～2000倍	200～700L/10a	発生初期但し、収穫前日まで	–
野菜類	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ	1000倍	100～300L/10a		
	アオムシ、コナガ、シロイチモジヨトウ	1000～2000倍			
だいこん チンゲンサイ ブロッコリー	ハイマダラノメイガ	1000倍			
キャベツ	ネギアザミウマ ハイマダラノメイガ	1000倍			
	ウワバ類	1000～2000倍			
はくさい	ハイマダラノメイガ	1000倍			
レタス	ウワバ類	1000～2000倍			
にんにく	ネギコガ				
雑穀類（そばを除く）	アワノメイガ	2000倍			
そば	ハスモンヨトウ ヨトウムシ				
飼料用とうもろこし	アワノメイガ				
花き類・観葉植物	オオタバコガ	1000倍		発生初期	

*印は、本剤およびBTを含む農薬の総使用回数の制限を示す。　　使用方法：散布

■チョウ目害虫に対する効果

■コナガ（キャベツ）


群馬県園芸試験場（1998年）



品種：涼嶺41号
区制：1区5.8m²　28株/区　2連制
処理日：5月8日
処理量：200ℓ/10a
発生状況：少発生
調査日：5月22日（散布14日後）
調査方法：各区10株について寄生する幼虫数を調査。

■ハスモンヨトウ（キャベツ）

（社）日本植物防疫協会高知試験場（1998年）



品種：アーリーボール
区制：1区5.0m²（1.6m×3.15m）16株2反復
処理日：11月8日
処理量：200ℓ/10a
発生状況：多発生
調査日：11月15日（散布7日後）
調査方法：各区10株の株全体に寄生する幼虫数を調査。

⚠〈使用上の注意〉詳細はラベルをご参照ください。

●散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
●使用に当っては、展着剤を加用することが望ましい。
●アルカリ性の強い石灰硫黄合剤、ボルドー液などの農薬及びアルカリ性の強い薬面施用の肥料などとの混用はさけてください。
●若令幼虫に有効なので、若令幼虫期に時期を失せず散布してください。
●蚕に対する毒性があるので、養蚕主産県その他主要養蚕地帯及び養蚕農家、共同飼育場などの周辺では施用しないでください。また、これら以外の場所でも付近に桑園がある場合は、飛散してかからないよう風向等に十分注意して散布してください。なお、本剤の使用に当っては、散布地域の使用規制に従ってください。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
●ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
●吸湿すると固化したり、効果が低下したりすることがあるので、貯蔵に当っては湿気に注意し、特に使用残りの薬剤は密封して乾燥した冷暗所に貯蔵してください。
●空中散布には使用しないでください。
●適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
●眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
●皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
●散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
●直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場に放置せず適切に処理してください。

08R10J26F01:T

OATアグリオ株式会社
https://www.oat-agrio.co.jp/
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1
コールセンター：050-1724-6881（9:00～12:00、13:00～17:00 土・日・祝日をのぞく）